

OCTOBRE ROSE

#PRÉVENIR / GUÉRIR

CANCER DU SEIN

Le dépistage, c'est à partir de 25 ans !

Un diagnostic précoce constitue le meilleur moyen d'agir contre le cancer du sein. En effet, s'il est détecté assez tôt, ce cancer peut non seulement être guéri mais aussi être soigné avec des traitements moins agressifs et moins mutilants. Et pourtant, les dépistages, simples et remboursés, sont en baisse. Alors mobilisons-nous !

+ d'infos sur



preventioncancers.fr

Une femme sur 8 développe un cancer du sein au cours de sa vie. Détecté tôt, le cancer du sein guérit dans 9 cas sur 10. C'est entre 50 et 74 ans que survient la découverte de 80% des cancers du sein et que les femmes sont le plus exposées, ceci justifie la stratégie de dépistage organisée mise en place en France chez les femmes dans cette tranche d'âge. Après 74 ans, le dépistage n'est pas abandonné, mais individualisé.

Et à France Travail ?

L'accord QVT signé le 17 mars 2022 a prévu dans son axe 3 (concourir à une meilleure santé des agents), point 7 (maladies chroniques et maladies graves), des actions de prévention par le biais de sensibilisations, de partenariats, et de facilités horaires pour bénéficier d'action de dépistage.

L'accord QVT prévoit également des mesures d'accompagnement :

- Mobilisation du volet action sociale de l'offre de services proposée par malakoff humanis : CESU pour aide à domicile, séances gratuites de thérapie sportive, accès à ALLO Alex qui répond à vos questions sur le cancer, participation financière aux programmes qui favorisent le bien être moral et l'image de soi ...
- Signature d'une charte visant à une meilleure prise en compte du cancer au travail et travail de sensibilisation.
- Travail de facilitation du maintien et du retour à l'emploi (accompagnement des équipes et en aménageant des conditions de travail adaptées).

Et les hommes dans tout ça ?

Les hommes peuvent également développer un cancer du sein. Ces cas sont cependant rares, puisqu'ils représentent moins de 1 % du nombre total de cancers du sein et ils sont plus fréquemment diagnostiqués après 60 ans.